

# Lithostratigraphische Gliederung des Rotliegend im Saar-Nahe-Becken

(Stand 10. 2004)

ältere

aktuelle

WEISS (1889)		AMMON & REIS (1910)		FALKE (1954)		ATZBACH & SCHWAB (1971)		BOY & FICHTER (1982)		Rotlieg.AG der Strat. Subkomm. (1995)				
Oberes Rothliegendes	Kreuznacher Sch.  (Monzinger Sch.)	Oberrothliegendes	Standenbühler Schichten	Kreuznacher Gruppe		Nahe Gruppe		Nahe-Gruppe		Nahe - Subgruppe	(i.d. Nahe-Mulde)	(i.d. Pfälzer Mulde)		
	Waderner Sch.											Kreuznach-Formation	Niersteinerhorst-Form.	
Unteres Rothliegendes	Söterner Sch.		Winnweiler S. Hochsteiner S.	Grenzlager Gruppe		Lebacher Gruppe		Freisener Sch.		Glan - Subgruppe	Sponheim-Formation		Standenbühl - F.	
	Tholeyer Sch.	Ob. Leb.S.	Olsbrücker S.											Ob. Tholeyer Gr.
			Schweisw. S.	Mittl. Tholeyer Gr.	Oberkirchen.S.						Oberkirchen-S.	Donnersberg-Formation	Jakobsweiler-Subform.	
	Lebacher Sch.		Unt. Tholeyer Gr.	Ob. Lebacher Gr.	Disibodenb. S.						Disibodenberg-S.		Höringen-Subform.	
		Obere Kuseler Sch.	Hoofer S.	Mittl. Lebacher Gr.	Odernheimer S.						Odernheim-  bis		Wingertsweilerhof-Subf.	
			Unt. Lebacher Gr.	Unt. Lebacher Gr.	Jeckenbacher Schichten								Lauterecken-S.	Schallodenbach-Subf.
	Obere Cuseler Schichten		Alsenser S.	Ob. Kuseler Gr.	Lauterecken. S.						Lauterecken-Formation			Schweisweiler-Subform.
		Unt.Kus.S.	Odenbacher S.	Mittl.Kuseler Gr.	Quirnbacher S.						Quirnbach-S.	Meisenheim Formation		Odernheim-Subform.
	Untere Cuseler S.		Wahnweger S.	Unt. Kuseler Gr.	Wahnweger S.						Wahnwegen-S.			Jeckenbach-Subform.
			Altenglaner S.		Altenglaner S.						Altenglan-S.	Lauterecken-Formation		Lauterecken-Formation
		Remigiusb. S.		Remigiusb. S.	Remigiusberg-S.	Quirnbach-Formation								
						Wahnwegen-Formation								
						Altenglan-Formation								
						Remigiusberg-Format.								